

## Etape 1 : Score nutritionnel (Mini MNA® adapté)

<b>A. Motricité actuelle</b>			<b>F. Poids</b>	
<i>Dans les 3 derniers mois</i>			___ kg	
Du lit au fauteuil	0		<b>Pas disponible *</b>	
Autonome à l'intérieur/dans la chambre	1		<i>*Si le poids n'est pas disponible :</i>	
Sort du domicile/dans les espaces communs	2		<i>Remplacer par la question F' : circonférence brachiale (CB) et ne répondez pas aux questions G et H.</i>	
<b>B. Maladie aigüe ou stress psychologique</b>			<b>F'. Circonférence brachiale (CB)</b>	
<i>Dans les 3 derniers mois</i>			___ cm	
Oui	0		CB < 21	0
Non	2		21 ≤ CB ≤ 22	1.5
<b>C. Problèmes neuropsychologiques</b>			CB > 22	3
Démence ou dépression sévère	0		<b>G. Taille</b>	
Démence légère	1		___ cm	
Aucun	2		<b>Pas disponible **</b>	
<b>D. Le patient présente-t-il une perte d'appétit ?</b>			<i>**Si la taille n'est pas disponible, mesurez la distance talon/genou et calculez la taille réelle avec les formules ci-dessous (ou reportez-vous au tableau de conversion) :</i>	
<i>A-t-il moins mangé ces trois derniers mois par manque d'appétit, pb digestifs, mastication, déglutition ?</i>			<i>Femme : taille (cm) = 84,88 - 0,24 x âge (années) + 1,83 x taille de la jambe (cm).</i>	
Baisse sévère des prises alimentaires	0		<i>Homme : taille (cm) = 64,19 - 0,04 x âge (années) + 2,03 x taille de la jambe (cm).</i>	
Légère baisse des prises alimentaires	1		<b>H. En fonction des réponses F et G</b>	
Pas de baisse des prises alimentaires	2		Calculez l'IMC (Poids (kg)/Taille (m) <sup>2</sup> )	
<b>E. Perte récente de poids</b>			IMC < 19	
<i>Ces 3 derniers mois</i>			19 ≤ IMC < 21	
>3 kg	0		21 ≤ IMC < 23	
Ne sait pas	1		IMC ≥ 23	
1 à 3 kg	2			
Pas de perte de poids	3			

SCORE cumulé : /14

## Etape 2 : Evaluation de la prise alimentaire



SCORE : \_\_\_\_\_

## Etape 3 : Résultat de l'évaluation

		Score Nutritionnel (étape 1)		
		(12-14)	(8-11)	(0-7)
Score évaluation de la prise alimentaire (étape 2)	<b>Mange bien</b> (Entre 10-6 inclus)	<b>Patient non dénutri</b> Surveillance	<b>Patient à risque</b> Conseils diététiques Alimentation enrichie Réévaluation à 1 mois	<b>Patient dénutri</b> Conseils diététiques Alimentation enrichie et CNO Réévaluation à 15 jours
	<b>Mange moins bien</b> (Entre 6-3 inclus)	<b>Patient à risque</b> Conseils diététiques Alimentation enrichie Réévaluation à 1 mois	<b>Patient dénutri</b> Conseils diététiques Alimentation enrichie Réévaluation à 15 jours et si échec : CNO	<b>Patient dénutri</b> Conseils diététiques Alimentation enrichie et CNO Réévaluation à 1 semaine et si échec : NE
	<b>Ne mange plus</b> (Entre 3-0)	<b>Patient dénutri</b> Conseils diététiques Alimentation enrichie Réévaluation à 1 semaine, et si échec : CNO	<b>Patient dénutri</b> Conseils diététiques Alimentation enrichie et CNO Réévaluation à 1 semaine et si échec : NE	<b>Patient sévèrement dénutri</b> Conseils diététiques Alimentation enrichie et NE d'emblée Réévaluation à 1 semaine